

帯状疱疹ワクチンは2種類あります

お取り寄せに**1週間**程度かかりますので、**事前**にお電話等でご連絡ください。

対象年齢は50歳以上です。コロナワクチンとは接種間隔を前後2週間空けてください。

商品名	シングリックス	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
販売元	グラクソ・スミスクライン	田辺三菱製薬
		
種類	不活化ワクチン	弱毒生ワクチン
接種方法	筋肉注射	皮下注射
接種回数	2回	1回
接種間隔	2ヶ月後（遅くとも半年以内）	—
費用	22,000円/回※	8,800円
接種不適当者	特になし	免疫抑制状態 抗がん剤・抗リウマチ薬治療中
副反応	接種部の痛み、腫れ 筋肉痛、倦怠感、頭痛 (やや強め)	接種部の痛み、腫れ (弱め)
帯状疱疹発症 予防効果	50歳以上 97.2% 70歳以上 89.8%	51.3%
神経痛予防効 果	50歳以上 85～100% 70歳以上 85.5%	66.5%
持続期間	8年後に84%の有効率	8～10年で効果消失
長所	予防効果が高い 免疫低下の方にも接種可能	安価 接種回数が1回
短所	高価 接種回数が2回	予防効果が低い 免疫低下の方に接種不可

※効果の持続期間や予防効果率には個人差がございます。

※初回接種時に2回分44,000円まとめてお支払いいただきます。武藏小杉皮ふ科、こすぎ皮ふ科、御嶽山皮ふ科では各種クレジットカードをご利用いただけます。
(下丸子皮ふ科では現金のみのお取扱となります)